PRIM Schedule 52 BS3 PP
Medicamento sujeito a receita médica - Lista C

DUTASTERIDA + TAMSULOSINA, LAMIVUDINA e TENOFOVIR DISOPROXIL

Este destaques não inclui todas a informação necessária para usar corretamente de DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA e FUMARATO DE TENOFOVIR DISOPROXIL com segurança e eficácia. Consulte a informação Completa de Prescrição para comprimidos de DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA e FUMARATO DE TENOFOVIR DISOPROXIL.

Comprimidos de DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA e FUMARATO DE TENOFOVIR DISOPROXIL, para uso oral
ADVERTÊNCIA: ACIDOSE LÁTICA E HEPATOMEGALIA COM ESTEATOSE E EXACERBAÇÕES PÓS-TRATAMENTO DA HEPATITE B

Consulte a informação completa de prescrição par inicio a advertência em puede descansar.

- **Foram relatadas casos de acidose láctica e hepatomegalia grave com esteatose, incluindo casos fatais, com o uso de análogos nucleosídeos. (5.1)**
- **Descontinue o tratamento Análogos agudas graves de hepatite B em doentes coinfectados por VHB e vírus da imunodeficiência humana VIH-1 que interrompem a terapêutica anti-retroviral. Monitorize a função hepática durante o tratamento de tenofovir disoproxil, dois componentes da dolutegravir, e componentes de lamivudina e fumarato de tenofovir disoproxil. (5.2) Dados hepáticos ocultos durante os doentes devem ser monitorizados da parte a. ao apropriado, deve ser iniciada a tratamento anti-hepatite B. (5.2)**

INDICAÇÕES E USO

Os comprimidos de dolutegravir, lamivudina e fumarato de tenofovir disoproxil, uma combinação de dolutegravir bidolar de integrase, um inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo (INTR) lamivudina e um INTR análogo de nucleotídeo da transcriptase reversa, são indicados para o tratamento sem regime completo para o tratamento da infeção por VIH-1 em doentes adultos e pediátricos com peso igual ou superior a 35 kg.

Limitações de Uso:

- A combinação de dolutegravir, lamivudina e fumarato de tenofovir disoproxil isolado não são recomendados em doentes com infeção do vírus da hepatite B crónica e associada à resistência a um ou mais inibidores da transcriptase reversa da hepatite B, devido à falta de dados de otimização nos grupos de dolutegravir nos comprimidos de dolutegravir, lamivudina e fumarato de tenofovir disoproxil e resistência nessas subpopulações. Consulte a informação completa de prescrição para obter mais detalhes. (1)

POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 40 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 35 kg e inferior a 40 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 25 kg e inferior a 35 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 20 kg e inferior a 25 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 15 kg e inferior a 20 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 10 kg e inferior a 15 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 5 kg e inferior a 10 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 3 kg e inferior a 5 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 2 kg e inferior a 3 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 1 kg e inferior a 2 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,5 kg e inferior a 1 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,25 kg e inferior a 0,5 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,1 kg e inferior a 0,25 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,05 kg e inferior a 0,1 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,025 kg e inferior a 0,05 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,01 kg e inferior a 0,025 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,005 kg e inferior a 0,01 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,001 kg e inferior a 0,005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0005 kg e inferior a 0,001 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0001 kg e inferior a 0,0005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00005 kg e inferior a 0,0001 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00001 kg e inferior a 0,00005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000005 kg e inferior a 0,00001 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000001 kg e inferior a 0,000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000005 kg e inferior a 0,000001 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000005 kg e inferior a 0,0000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000005 kg e inferior a 0,00000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000005 kg e inferior a 0,000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000005 kg e inferior a 0,0000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000005 kg e inferior a 0,00000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000005 kg e inferior a 0,000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000005 kg e inferior a 0,0000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000005 kg e inferior a 0,000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000005 kg e inferior a 0,000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000005 kg e inferior a 0,000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000005 kg e inferior a 0,000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 kg e inferior a 0,00000000000000000005 kg): Um comprimido uma vez ao dia tomado por via oral com alimentos. (2.1)
- Deve recomendada em diversos adultos e pediátricos (12 anos de idade ou mais e mais velhos, pesando pelo menos 0,00000