



FARMACUTA DESPREMADU® Y DE LAS INSTRUCCIONES DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Despremadu®
Tabletas 50 mg

¿Cuáles despremadu® tabletas? Despremadu® tabletas es un medicamento de prescripción que es utilizado para la prevención de la fiebre de las montañas (fiebre tifoidea) causada por el bacterio Salmonella typhi. Este medicamento también puede utilizarse para tratar la fiebre tifoidea.

En los EE.UU. el uso de Despremadu® tabletas está aprobado para la prevención de la fiebre de las montañas (fiebre tifoidea) causada por el bacterio Salmonella typhi. Este medicamento también puede utilizarse para tratar la fiebre tifoidea.

Antes de tomar despremadu® tabletas, informe a su proveedor de cuidados de salud sobre todos los medicamentos que está tomando, especialmente si está tomando otros medicamentos para la fiebre tifoidea.

Registre de Efectores. Escriba un registro de efectos para los síntomas que experimente al tomar despremadu® tabletas. Esto puede ayudar a su proveedor de cuidados de salud a determinar si los síntomas son causados por el medicamento o por otra condición médica.

Informe a su proveedor de cuidados de salud sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos de prescripción y venta libre, vitaminas y suplementos dietéticos.

Algunos medicamentos interactúan con despremadu® tabletas. Mantenga una lista de sus medicamentos y envíela a su proveedor de cuidados de salud y farmacéutico para que los revise.

¿Cuáles despremadu® tabletas exactamente como se prescriben? Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben. No tome despremadu® tabletas con alimentos.

Si usted toma despremadu® tabletas con alimentos, puede tomar otros suplementos dietéticos que toman despremadu® tabletas. Esto puede ayudar a su proveedor de cuidados de salud a determinar si los síntomas son causados por el medicamento o por otra condición médica.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de despremadu® tabletas? Despremadu® tabletas puede causar efectos secundarios serios, incluyendo: Reacciones alérgicas. Contáctese a su proveedor de cuidados de salud inmediatamente si desarrolla una erupción que despremadu® tabletas.

Problemas hepáticos. Las personas con un historial de virus de hepatitis B o C pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar problemas hepáticos. Los problemas hepáticos, también llamados insuficiencia hepática, han ocurrido también en personas con un historial de enfermedad hepática o otros factores de riesgo.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas? Los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas incluyen: Puntos morados o rojos en la piel, especialmente en las extremidades.

Montepradol despremadu® tabletas y todos los medicamentos fuera del alcance de estos.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de despremadu® tabletas. Algunas veces, los medicamentos son prescritos para propósitos distintos a los indicados en el folleto de información al paciente. No utilice despremadu® tabletas para una condición para la cual no fue prescrito.

¿Cuáles son los ingredientes de despremadu® tabletas? Los ingredientes de despremadu® tabletas incluyen: clorhidrato de clorfeniramina, clorhidrato de hidrocortisona, clorhidrato de pseudoefedrina, clorhidrato de prometazina, clorhidrato de terfenadina, clorhidrato de triprolidina, clorhidrato de cetirizina, clorhidrato de loratadina, clorhidrato de fexofenadina, clorhidrato de levocetirizina, clorhidrato de desloratadina, clorhidrato de rupatadina, clorhidrato de ebastina, clorhidrato de fexofenadina, clorhidrato de levocetirizina, clorhidrato de desloratadina, clorhidrato de rupatadina, clorhidrato de ebastina.

Manufacturado por: HETERO LABS LIMITED, 22110, L.S.A., Jeddah, Arabia Saudita Occidental, Arabia Saudita.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Table with 4 columns: Efecto secundario, Grado de gravedad, Prevalencia, y Tratamiento. Rows include: Erupción cutánea, Dolor de cabeza, Náusea, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de clorfeniramina, Clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de pseudoefedrina, Clorhidrato de prometazina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de terfenadina, Clorhidrato de triprolidina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de cetirizina, Clorhidrato de loratadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de fexofenadina, Clorhidrato de levocetirizina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de desloratadina, Clorhidrato de rupatadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de ebastina, Clorhidrato de fexofenadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de levocetirizina, Clorhidrato de desloratadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de rupatadina, Clorhidrato de ebastina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de fexofenadina, Clorhidrato de levocetirizina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de desloratadina, Clorhidrato de rupatadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de ebastina, Clorhidrato de fexofenadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de levocetirizina, Clorhidrato de desloratadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de rupatadina, Clorhidrato de ebastina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de fexofenadina, Clorhidrato de levocetirizina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de desloratadina, Clorhidrato de rupatadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de ebastina, Clorhidrato de fexofenadina, etc.

¿Cómo tomar despremadu® tabletas? Tome despremadu® tabletas con agua, sin alimentos. Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben.

¿Cuáles despremadu® tabletas exactamente como se prescriben? Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben. No tome despremadu® tabletas con alimentos.

Si usted toma despremadu® tabletas con alimentos, puede tomar otros suplementos dietéticos que toman despremadu® tabletas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de despremadu® tabletas? Despremadu® tabletas puede causar efectos secundarios serios, incluyendo: Reacciones alérgicas.

Problemas hepáticos. Las personas con un historial de virus de hepatitis B o C pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar problemas hepáticos.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas? Los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas incluyen: Puntos morados o rojos en la piel.

Montepradol despremadu® tabletas y todos los medicamentos fuera del alcance de estos.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de despremadu® tabletas. Algunas veces, los medicamentos son prescritos para propósitos distintos a los indicados en el folleto de información al paciente.

¿Cuáles son los ingredientes de despremadu® tabletas? Los ingredientes de despremadu® tabletas incluyen: clorhidrato de clorfeniramina, clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Manufacturado por: HETERO LABS LIMITED, 22110, L.S.A., Jeddah, Arabia Saudita Occidental, Arabia Saudita.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Table with 4 columns: Efecto secundario, Grado de gravedad, Prevalencia, y Tratamiento. Rows include: Erupción cutánea, Dolor de cabeza, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de clorfeniramina, Clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de pseudoefedrina, Clorhidrato de prometazina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de terfenadina, Clorhidrato de triprolidina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de cetirizina, Clorhidrato de loratadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de fexofenadina, Clorhidrato de levocetirizina, etc.

¿Cómo tomar despremadu® tabletas? Tome despremadu® tabletas con agua, sin alimentos. Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben.

¿Cuáles despremadu® tabletas exactamente como se prescriben? Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben. No tome despremadu® tabletas con alimentos.

Si usted toma despremadu® tabletas con alimentos, puede tomar otros suplementos dietéticos que toman despremadu® tabletas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de despremadu® tabletas? Despremadu® tabletas puede causar efectos secundarios serios, incluyendo: Reacciones alérgicas.

Problemas hepáticos. Las personas con un historial de virus de hepatitis B o C pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar problemas hepáticos.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas? Los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas incluyen: Puntos morados o rojos en la piel.

Montepradol despremadu® tabletas y todos los medicamentos fuera del alcance de estos.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de despremadu® tabletas. Algunas veces, los medicamentos son prescritos para propósitos distintos a los indicados en el folleto de información al paciente.

¿Cuáles son los ingredientes de despremadu® tabletas? Los ingredientes de despremadu® tabletas incluyen: clorhidrato de clorfeniramina, clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Manufacturado por: HETERO LABS LIMITED, 22110, L.S.A., Jeddah, Arabia Saudita Occidental, Arabia Saudita.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Table with 4 columns: Efecto secundario, Grado de gravedad, Prevalencia, y Tratamiento. Rows include: Erupción cutánea, Dolor de cabeza, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de clorfeniramina, Clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de pseudoefedrina, Clorhidrato de prometazina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de terfenadina, Clorhidrato de triprolidina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de cetirizina, Clorhidrato de loratadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de fexofenadina, Clorhidrato de levocetirizina, etc.

¿Cómo tomar despremadu® tabletas? Tome despremadu® tabletas con agua, sin alimentos. Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben.

¿Cuáles despremadu® tabletas exactamente como se prescriben? Tome despremadu® tabletas exactamente como se prescriben. No tome despremadu® tabletas con alimentos.

Si usted toma despremadu® tabletas con alimentos, puede tomar otros suplementos dietéticos que toman despremadu® tabletas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de despremadu® tabletas? Despremadu® tabletas puede causar efectos secundarios serios, incluyendo: Reacciones alérgicas.

Problemas hepáticos. Las personas con un historial de virus de hepatitis B o C pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar problemas hepáticos.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas? Los efectos secundarios más comunes de despremadu® tabletas incluyen: Puntos morados o rojos en la piel.

Montepradol despremadu® tabletas y todos los medicamentos fuera del alcance de estos.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de despremadu® tabletas. Algunas veces, los medicamentos son prescritos para propósitos distintos a los indicados en el folleto de información al paciente.

¿Cuáles son los ingredientes de despremadu® tabletas? Los ingredientes de despremadu® tabletas incluyen: clorhidrato de clorfeniramina, clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Manufacturado por: HETERO LABS LIMITED, 22110, L.S.A., Jeddah, Arabia Saudita Occidental, Arabia Saudita.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Table with 4 columns: Efecto secundario, Grado de gravedad, Prevalencia, y Tratamiento. Rows include: Erupción cutánea, Dolor de cabeza, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de clorfeniramina, Clorhidrato de hidrocortisona, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de pseudoefedrina, Clorhidrato de prometazina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de terfenadina, Clorhidrato de triprolidina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de cetirizina, Clorhidrato de loratadina, etc.

Table with 2 columns: Componente, Cantidad. Rows include: Clorhidrato de fexofenadina, Clorhidrato de levocetirizina, etc.

